

## DIAGNOZY ŁACIŃSKIE

SEKCJE:

### *Hoefitii* Nesp. sect. nov.

*Pilei carnosuli, convexo-plani-obtusati, alutacei, sericeo-maculati. Stipites subfistulosi, aequales, fibrilloso-striati, nudi, argenteo-albidi.*

Typus: *Cortinarius hoefitii* Weinm in Fr.

### *Subferruginei* Nesp. sect. nov.

*Pilei carnosi, glabrati, testaceo-gilvo-ferruginascentes hygrophanici. Stipites spongiosi, subbulbosi, cortina albido-sordida fibrillosa, fugaci. Caro in stipite ferruginascente, sine odore. Lamellis latis, opacis a pallidis ad ferruginascentes.*

Typus: *Cortinarius subferrugineus* (Batsch ex Fr.) Fr.

### *Sciophylli* Nesp. sect. nov.

*Pilei carnosuli, convexo-plano-umbonati, hygrophanici, plumbeo caeruleo-fusci, gilve expallentes. Stipites molles, albido-violaceo pallescentes. Lamellis confertis violaceo pallide cinnamomeis. Sporae 8—12  $\mu$ m longae.*

Typus: *Cortinarius sciophyllus* Fr. ss Lge.

### *Incisi* Nesp. sect. nov.

*Pilei stature minore, ferruginei, aurantio-fulvi, immato-fibrillosi, Stipites fistulosi, subcilindrici rufo-aurantio-fulvi, subannulati. Lamellis ochraceo-brunneo-cinnamomei. Sporae subtilis verrucosae, 6—12  $\mu$ m longae.*

Typus: *Cortinarius incisi* Pers. ex Fr.

### *Paleacei* Nesp. sect. nov.

*Pilei statura minore, submembranacei, conico-expansoumbonati, squamulis villosis albo-sericeo-fuscescentes. Stipites fistulosi, flexuosi, albo-squamulosi in apicem annulati.*

Typus: *Cortinarius paleaceus* Fr.

**Cyanites Nesp. sect. nov.**

*Pilei carborosi, obtuse-sericeo-laevigate, pallido caerulei. Stipites bulboso-laevigato-caerulei, intus succoso sanguineo rubescentes. Lamellis subconfertis, primum laete cyaneis.*

Typus: *Cortinarius cyanites* Fr.

## FORMY:

***Cortinarius saturatus* Lge. f. *pallescens* Nesp. f. nov.**

*Differt a typo in colore pilei pallido-ferruginei, bulbo stipitis albo emarginati. Habitatio: in silvis coniferis (Pinus, Picea).*

Typus nr 64/77 in herb. Nespiak. Leg. in Białowieża (Polonia).

***Cortinarius scutulatus* (Fr.) Fr. f. *minima* Nesp. f. nov.**

*Differt a typo in statura minore. Pileus 1—3 cm, cum margine albido velo floccoso obtectus. Habitatio: in silvis mixtis (Quercus, Carpinus, Picea).*

Typus nr 60/77 in herb. Nespiak. Leg. in Białowieża (Polonia).

***Cortinarius bicolor* Cke. f. *pumilus* Nesp. f. nov.**

*Differt a typo in spora, 6,5—8,5 × 4,5—5,5 μm. Habitatio: in silvis mixtis (Quercus, Pinus).*

Types nr 69/77 in herb. Nespiak. Leg. prope Komorów, Silesia (Polonia).